

# Gluco+

## Productomschrijving:

Gluco+ is het vochtrijk zetmeelrijk mengvoer. Het wordt als een inkuilbaar product afgeleverd. Gluco+ is zeer smakelijk, goudbruin van kleur en is het gehele jaar leverbaar.

## Samenstelling:

DS	290	g/kg	RE	122	g/kg ds	P	2,5	g/kg ds
VEM	1108	g/kg ds	RVET	32	g/kg ds	K	10,8	g/kg ds
VEVI	1207	g/kg ds	RC	101	g/kg ds	Na	0,7	g/kg ds
DVE	109	g/kg ds	RAS	42	g/kg ds	Mg	1,4	g/kg ds
OEB	-44	g/kg ds	SUI	51	g/kg ds	Ca	3,3	g/kg ds
FOS	601	g/kg ds	ZET	401	g/kg ds			
			BZET	116	g/kg ds			


\* De samenstelling van onze producten zijn gemiddelde waarden. Er kan echter een natuurlijke variatie in de samenstelling voorkomen.

## Voedertechisch:

Gluco+ combineert de voordelen van o.a. bierbostel en aardappelproducten. Bierbostel stimuleert de pens en daardoor wordt ook het zetmeel beter benut. Door de goede energievoorziening op zowel pens- als darmniveau, wordt de vorming van microbieel eiwit gestimuleerd. Ook wordt de benutting van darmverteerbaar eiwit verbeterd. Kortom de totale productie van melkeiwit stijgt. Daarnaast levert Gluco+ een hoeveelheid hoogwaardige aminozuren, die de melkeiwitproductie stimuleren.

Melkvee	4 – 12	kg product per dier per dag
Vleesvee	2 – 8	kg product per dier per dag
Jongvee	2 – 6	kg product per dier per dag
Geiten	1 – 3	kg product per dier per dag
Schape	1 – 4	kg product per dier per dag

## Verteringseigenschappen:



### **Aflevering en opslagadvies:**

Glucos wordt afgeleverd met kipauto, oplegger of vjzelwagen. Het is een zelf conserverend voedermiddel dat verzuurt naar een pH < 4,5. De vorming van mogelijk schadelijke microbiologische contaminanten wordt bij deze zuurgraad voorkomen.

Bij het inkuilen van Glucos dient op de volgende zaken te worden gelet:

1. Laat het product op een schone egale verharde ondergrond lossen.
2. Houdt er rekening mee dat regenwater niet in-, maar afstroomt. Ook inkuilen uit de wind en regenrichting zijn factoren die eventuele verliezen kunnen beperken.
3. Ons advies maximaal 80 centimeter hoog in te kuilen, dit voorkomt scheuren of uitzakken van het product.
4. Direct na aflevering dient het product afgedekt te worden.
5. Zorg dat het kuilplastic strak en luchtdicht over het product wordt getrokken, gebruik beslist onderfolie.
6. Gebruik een net tegen vogels, dit voorkomt gaten in het plastic.
7. Zorg voor voldoende druk op de kuil, zand voldoet uitstekend.
8. Na inkuilen, hebben de melkzuurbacteriën minimaal 1 à 2 weken nodig om de kuil te stabiliseren. Wanneer u eerder wilt starten met voeren is ons advies om een klein kuiltje apart te leggen en de grote kuil minimaal 1 week dicht te laten.

### **Kwaliteitsborging:**

Voor afkeurgrenzen, streefwaarden en actiegrenzen worden de SecureFeed- en GMP+ normen gehanteerd. De afwezigheid van contaminanten wordt geborgd aan de hand van een product specifieke risicobeoordeling welke middels een HACCP-methodiek worden gemonitord.

### **Glucos samengevat:**

- verhoogt het saldo,
- smakelijke aanvulling van het rantsoen;
- laag in kali;
- levert een hoge efficiëntie van stikstof in het rantsoen;
- verhoogt het eiwitpercentage in de melk;
- meer intramusculaire vetaanzetting (vleesvee);



*Glucos op graskuil*

Bel voor meer informatie, een rantsoeninventarisatie, aflevermogelijkheden en/of uw bestelling naar uw vertegenwoordiger of naar onze verkoopbinnendienst, telefoon (0252) 536 146.